



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instrucciones de respuesta a sobredosis de opioides

Use el aerosol nasal NARCAN® (clorhidrato de naloxona) para una sobredosis de opioides conocida o sospechada en adultos y niños.

Importante: Para uso en la nariz únicamente.

No retire ni pruebe el aerosol nasal NARCAN hasta que esté listo para usar.

1

Identifique la sobredosis de opioides y monitoree una respuesta

Pregunte a la persona si está bien y dígale su nombre.

Agite los hombros y frote con firmeza la mitad del pecho.

Verifique si hay signos de sobredosis de opioides:

- No se despierta ni responde a su voz o tacto
- La respiración es muy lenta, irregular o se ha detenido
- La parte central del ojo es muy pequeña, a veces llamada "pupilas puntiformes"

Coloque a la persona boca arriba para recibir una dosis del aerosol nasal NARCAN.




2


Aplique el aerosol nasal NARCAN

RETIRE el aerosol nasal NARCAN de la caja.

Retire la pestaña con el círculo para abrir el aerosol nasal NARCAN.



Sostenga el aerosol nasal NARCAN con el pulgar en la parte inferior del émbolo rojo y el primer dedo y el medio a cada lado de la boquilla.



Inserte suavemente la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales.

- Incline la cabeza de la persona hacia atrás y brinde apoyo con la mano debajo del cuello. Inserte suavemente la punta de la boquilla **en una fosa nasal** hasta que los dedos de ambos lados de la boquilla estén contra la parte inferior de la nariz de la persona.



Presione firmemente el émbolo rojo para administrar la dosis del aerosol nasal NARCAN.

- Retire el aerosol nasal NARCAN de la fosa nasal después de administrar la dosis.



3

Llame para obtener ayuda médica de emergencia, evalúe y apoye

Solicite ayuda médica de emergencia de inmediato.



Ponga a la persona de costado (posición de recuperación)

después de administrar el aerosol nasal NARCAN.

Monitoree a la persona de cerca.

Si la persona no responde despertándose, con la voz o el tacto, o comienza a respirar normalmente, se puede administrar otra dosis. El aerosol nasal NARCAN se puede administrar cada 2 a 3 minutos, si está disponible.

Repita el Paso 2 con un nuevo aerosol nasal NARCAN para administrar otra dosis en la otra fosa nasal. Si se dispone de aerosoles nasales NARCAN adicionales, puede repetir el paso 2 cada 2 a 3 minutos hasta que la persona responda o se reciba ayuda médica de emergencia.

Para obtener más información sobre el aerosol nasal NARCAN, visite www.narcan.com o llame al 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226). Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

©2020 Emergent Devices Inc. NARCAN® es una marca comercial registrada de Emergent Operations Ireland Limited.

A1142